

エマルジョン型シリコーン消泡剤

サンコーポール AM

特徴

サンコーポールAMは、消泡作用の大きなシリコーンオイルコンパウンドを乳化して水中油型としたエマルジョン型消泡剤で、従来から使用されているアルコール系、脂肪酸系、エーテル系、脂肪酸エステル系、リン酸エステル系等に比べ安定性、安全性が高く、種々の水溶液に対して微量の添加でも優れた消泡・抑泡効果を発揮します。

性状

外 観	乳白色液体
主 成 分	シリコーンオイル
イ オ ン 性	ノニオン
真 比 重	1.01

使用法

あらかじめ水で5～10倍程度(10倍以上に希釈すると希釈液の安定性が損なわれ、分離することがあります。)に希釈し、均一になるまで攪拌してください。

この希釈液を直接泡立っているところへ滴下するか、エアージェットなどを用いて泡に吹きかけてください。消泡剤が泡に打ち当たることによる破泡と、添加されて液中に分散した消泡剤による抑泡効果が相乗され、大量の泡を消すことができます。スプレーガンのノズルの口径は太い方が好ましく、細すぎて消泡剤が霧のようになっては効果的ではありません。

直ちに消泡しない場合は消泡剤の濃度を上げるか、少し時間をおいて泡をしばらく放置してから消泡してください。

一度希釈した消泡剤溶液はできるだけ使い切ってください。希釈した消泡剤溶液を長時間放置しますと分離することがありますが、もう一度均一に攪拌すればそのまま御使用になれます。

取り扱い上の注意

- 1) サンコーポールAMを取り扱う場合は保護手袋、保護めがね、保護マスクを着用し、できるだけ衣服や身体に触れないようにして下さい。特に目等の粘膜面への付着には注意して下さい。取り扱い後は、手洗い、うがい、洗顔を十分行って下さい。

〈応急処置〉

- ・目に入った場合は大量の水で15分以上洗浄し、直ちに医師の診察を受けて下さい。
 - ・誤って飲んだ場合は水で口の中を洗い、水又は牛乳を飲ませ吐き出させて下さい(無理に吐き出させない)。その後直ちに医師の診察を受けて下さい。
 - ・皮膚に付着した場合は石鹼水で洗浄した後、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 2) こぼれた場合は可能な限りウエスなどでふき取った後、多量の水で洗い流して下さい。
 - 3) 保管の際は必ず密栓をして直射日光を避け、換気の良い冷暗所に保管して下さい。
 - 4) 長期保存しますと液層が分離する場合がありますが、品質には何ら影響はありません。御使用前によく攪拌して下さい。

荷姿

15kg 石油缶

